

## Autres signes évocateurs de l'**ANOXIE**

- **Veau essoufflé**  
*Respiration irrégulière*
- **Troubles du rythme cardiaque**  
*Tachycardie  
puis bradycardie*
- **Hypothermie**  
*Température rectale  
inférieure à 39°C*
- **Expulsion précoce du méconium**  
*Eaux fœtales  
brunâtres*



100318 - A11 - Conception et réalisation graphiques : Vica Vessa Clermont-Fd, 04 73 90 94 05 - Illustrations : Brunon Bigourd - Crédit photos : WeAgroSap, carte postale de l'Anoxie, Fotolia.com



Cachet du vétérinaire

# ANOXIE *cérébrale*

*Un  
traitement  
existe*



*Interrogez  
votre vétérinaire*



La mortalité  
du veau dans  
les premières  
24 heures  
est à relier  
directement  
à l'anoxie  
cérébrale.

## Facteurs prédisposant à l'**ANOXIE**

### Liés à la race

- Charolaise
- Laitières croisées « viande »
  - Blonde d'Aquitaine
  - Rouge des prés
  - Blanc-bleu
  - ...



### Liés au vêlage

#### Extraction forcée

*Durée du vêlage allongée*

#### Génisse

*Disproportion  
fœto-maternelle*

#### Présentation postérieure

*Rupture trop précoce  
du cordon*

#### Césarienne

*Compression thoracique  
du veau insuffisante  
pour évacuer le liquide  
pulmonaire résiduel*

### Liés au veau

#### Veau trop lourd (> 55 kg)

*Culard, veau conformé  
Extraction forcée, vêlage trop long*

#### Veau très léger (< 35 kg)

*Prématuré, veaux jumeaux  
Compression thoracique  
du veau insuffisante pour évacuer  
le liquide pulmonaire résiduel*

## Signes traduisant une **ANOXIE**

Langue  
et muqueuse  
cyanosées  
*Bleues*



Veau mou  
*Adynamie*



Pas de réflexe  
de tétée



Œil réversé



Phases  
convulsives  
*Raideur du corps*



Veau "idiot"  
*Anorexie  
différée*



**Anoxie cérébrale**

Privation d'oxygène  
durant les premières minutes de la vie  
du veau pouvant entraîner la mort ou des séquelles  
(anorexie, mauvais démarrage, ...).



Dès que l'un de ces signes apparaît,  
il est grand temps d'agir