



Soutien du transit

PLACE DE L'ALIMENTATION

dans la prise en charge des ralentissements voire arrêts de transit (stase digestive)^{1,2}



CALME

L'hospitalisation est souhaitable.

Le lapin doit être maintenu au chaud dans un environnement calme et adapté (espace, sécurité, localisation,...).



ANALGÉSIE

C'est la priorité!

La douleur induit du stress et donc une auto-aggravation de l'iléus.



RÉHYDRATATION

Le lapin anorexique est systématiquement déshydraté.

Une fluidothérapie pourra être mise en place.
Une administration d'eau ou de jus de fruit devra aussi se faire par voie orale afin de réhydrater le bol alimentaire gastrique.



OUVRIR L'APPÉTIT!

Pour lutter contre l'acido-cétose consécutive à une anorexie.

Il faut proposer au lapin des aliments appétents et riches en fibres (herbe, verdure, foin de très bonne qualité,...). Si le lapin refuse de s'alimenter seul, il faudra alors avoir recours à un gavage régulier, avec des aliments adaptés.



TRANSIT

Restaurer et soutenir le transit.

Les aliments fibreux vont permettre d'accélérer le transit. À cette action mécanique, il est possible d'associer des médicaments (gastrokinétiques, antiacides, antispasmodiques,...) pour stimuler et soutenir le péristaltisme.

Rééquilibrer la microflore intestinale.

L'administration de probiotiques et prébiotiques permet d'améliorer la digestion et de limiter les risques de prolifération de bactéries pathogènes.

PARTIE MÉDICALE:

à mettre en place en cas d'arrêt du transit ou si le ralentissement du transit est lié à un traumatisme.

PARTIE ALIMENTATION:

à mettre en place systématiquement car l'alimentation est très souvent à l'origine du ralentissement de transit.