

LES DIARRHÉES AIGUËS

Traitement symptomatique de la diarrhée aiguë en association avec des mesures diététiques: diète de 12 heures et reprise progressive de l'alimentation




LOPERAL



ACTION


Action au niveau de l'intestin grêle, du côlon et du sphincter anal



Action prokinétique et antisécrétoire:

- Ne ralentit pas la vidange gastrique,
- Diminue les contractions propulsives,
- Renforce les contractions segmentaires,
- **Augmente le tonus du sphincter anal¹.**
- Favorise la **résorption de l'eau et des électrolytes** tout au long du tractus digestif,
- **Limite la sécrétion d'eau** dans la lumière intestinale.

Contractions propulsives Contractions segmentaires Réabsorption d'eau et d'électrolytes



COMPOSITION

Lopéramide: dérivé opiacé synthétique qui agit comme antidiarrhéique en diminuant l'hydratation du contenu digestif et en ralentissant le transit².



AVANTAGES

- **Stoppe la diarrhée** en respectant la **physiologie digestive**
- Permet une **réintroduction rapide d'une alimentation fractionnée**
- **Comprimés quadrisécables**
- En cas de surdosage, le loperamide possède **un antidote spécifique** d'action rapide, **la naloxone: 0,01 à 0,04 mg/kg en IV** (répéter aussi souvent que nécessaire)



POSOLOGIE

Chez le chien :
1 cp / 10 kg BID*
pendant 3 jours.



*BID: du latin, *Bis In Die* qui signifie deux fois par jour.

1. Plumb, D.C., 2018. Plumb's Veterinary Drug Handbook - 9th edition.
2. Desfontis J.C.: « Guide pratique des médicaments à usage vétérinaire », éditions Med Com (2010), p. 50-52; 78-81; 703-707.

LOPÉRAL. Composition: un comprimé pelliculé quadrisécable de 381 mg contient: loperamide (s.f. de chlorhydrate) 0,9300 mg.
Espèces cibles: chiens. **Indications d'utilisation:** traitement symptomatique de la diarrhée aiguë en association avec des mesures diététiques: diète de 12 heures et reprise progressive de l'alimentation. **Contre-indications:** ne pas utiliser chez les Colleys et apparentés. Ne pas utiliser en cas d'occlusion ou de suspicion d'occlusion intestinale. Ne pas utiliser chez les chiens âgés de moins de 3 mois. Ne pas utiliser chez les chiens pesant moins de 2 kg. Ne pas utiliser en cas d'entérite hémorragique. **Effets indésirables (fréquence et gravité):** après administration de loperamide, des signes digestifs (adipsie, anorexie, vomissements, constipation, diarrhée, ...) et des signes nerveux (prostration, ataxie, parésie, ...) ont été observés dans de rares cas chez les chiens traités, en particulier ceux présentant une mutation du gène MDRI. **Classement du médicament en matière de délivrance:** usage vétérinaire. Liste II. A ne délivrer que sur ordonnance. Respecter les doses prescrites.

tvm INNOVATIVE
ANIMAL HEALTH


GastroEntero360°
Pour des solutions en gastro-entérologie